

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

®

AUVERGNE ET LIMOUSIN

DLP 19-7-85535317

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

Cité Administrative, rue Pélissier

63034 Clermont Ferrand Cedex

(73) 92-42-68



BULLETIN TECHNIQUE  
PUBLICATION PERIODIQUE

## Grandes Cultures

Le 10 Juillet 1985

n°13

### MAIS

#### PYRALE

##### . Situation

Les captures aux pièges sexuels ont débuté dans la dernière semaine de juin en tous secteurs. En cage d'élevage, les sorties de papillons se sont intensifiées depuis le début de la semaine.

Les premières pontes ont été observées le 5 Juillet dans le département de l'ALLIER.

Le maïs est actuellement en croissance rapide.

##### Préconisation

Compte-tenu de l'évolution de la Pyrale, de la croissance du maïs et des conditions climatiques, la période d'intervention avec des micro-granulés est à situer entre le 15 et le 25 Juillet pour les départements de l'ALLIER, du PUY-DE-DOME, de la CREUSE, de la CORREZE et de la HAUTE-VIENNE. Commencer par les parcelles les plus précoces.

Ce traitement à l'aide d'insecticides micro-granulés doit rester la méthode de base. La meilleure rétention du produit sur le maïs est obtenue lorsque les panicules mâles sont visibles au fond du cornet.

Pour le choix des spécialités, consulter le dépliant publié dans le bulletin n° 5 du 10 Avril 1985.

### BETTERAVE

#### MALADIES DU FEUILLAGE

L'Oïdium et la Cercosporiose sont les deux principales maladies rencontrées en Auvergne. Des attaques de Ramulariose peuvent être observées localement. La Rouille a tendance à se développer en fin de saison.

Un traitement est à effectuer dès l'observation des premiers symptômes d'Oïdium ou de Cercosporiose. Dans tous les cas la spécialité devra être efficace sur l'Oïdium.

P. 2. 1

DIRECTEUR-GERANT : B. MORIN

N° de série : 466

Numero d'inscription à  
le C.P.P.A.P. : 525 A.D.

Regie de Recettes de la D.D.A.  
C.C.P. Clermont-Ferrand 5 503.17

ABONNEMENT

ANNUEL : 100 F

Trois semaines après le premier, si la culture peut encore compter sur 1 mois 1/2 de végétation, un second traitement est à envisager. A cette période, plusieurs maladies sont souvent présentes à des degrés divers et l'utilisation d'un produit polyvalent est alors justifiée.

*Actuellement, la situation est saine. Il est encore trop tôt pour intervenir.*

MATIERES ACTIVES	SPEC. COMMERCIALES	Dose homologuée (kg ou l/ha)			
		cercos.	oïdium	ramula.	rouille
bénomyl, carbendazime	nombreuses spécialités	0,3			
thiabendazole	TEBUZATE	0,2			
méthylthiophanate + manèbe	PELTAR	2,0			
soufre micronisé	MICROTHIOL, THIOVIT...		8,0		
carb. + manèbe + soufre	BLEDOR 3, VOLNEBE		8,0		
fénarimol	RUBIGAN 4		1,0		
triadiméfon	BAYLETON 25		1,0		
carbendazime + triadiméfon	BAYLETON TOTAL	1,0	1,0		
manèbe + thioph. méthyl + soufre	PELTISAN	10,0	10,0		
thioph. méthyl + soufre	PELT S	8,0	8,0		
carb. + fénarimol+manèbe	RIMIDINE PLUS	2,5	2,5		
fentine acétate + manèbe	BRESTAN 10	2,5		2,5	
fentine hydrox. + soufre	TOPSUC	7,0	7,0	7,0	
( DITHANE LF		7,0		7,0	7,0
mancozèbe	DITHANE M 45	4,0		4,0	4,0
( SANDOZEBE		4,5		4,5	4,5
carb. + mancozèbe + fenpro-pimorphe	CORVET CM	2,0	2,0	2,0	2,0

#### Produits autorisés à la vente sur les maladies de la betterave